

# PROVA 3

## 1. In un reparto di terapia intensiva è necessario che sia sempre a disposizione

- a. Il necessario per la disinfezione delle ferite
- b. Un kit per la ventilazione forzata, per l'intubazione orotracheale e per la disinfezione delle ferite
- c. Il minimo necessario, per non avere troppo materiale difficile da pulire

## 2. In un reparto di degenza per animali da compagnia

- a. Accertarsi che tutte le gabbie siano chiuse correttamente
- b. Accertarsi che tutti gli animali abbiano acqua a disposizione
- c. Accertarsi che tutti gli animali abbiano cibo a disposizione

## 3. Per la manipolazione degli animali da affezione ricoverati nel reparto di degenza

- a. È importante che sia presente un veterinario
- b. Accertarsi che il soggetto non sia mordace
- c. Accertarsi che il soggetto non sia mordace e/o sia fornito di adeguato mezzo di contenimento (es. museruola, collare Elisabetta)

## 4. La somministrazione di alimento agli animali ricoverati in un reparto di terapia intensiva


- a. Deve avvenire esclusivamente con cibo umido
- b. Deve avvenire esclusivamente con cibo secco o con dieta preparata dal proprietario
- c. Deve essere valutata dal veterinario referente

## 5. Che cos'è il pallone Ambu?

- a. uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria
- b. uno strumento utilizzato per supportare l'attività cardiaca
- c. uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria e cardiaca

## 6. Il prelievo di sangue nel cane e nel gatto viene eseguito

- a. dalla vena giugulare esterna
- b. dalla vena cefalica o safena
- c. da tutte quelle indicate a i punti precedenti



**7. I disinfettanti più utilizzati in un reparto di degenza sono**

- a. Alcool etilico
- b. Sali di ammonio quaternario
- c. Alcool etilico, iodofori, clorexidina

**8. Come si conduce un cavallo?**

- a. Stando alla sua sinistra con il braccio destro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
- b. Stando alla sua destra con il braccio sinistro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
- c. Non ha importanza il lato, purché si mantenga la distanza di sicurezza

**9. Cosa deve sempre essere a disposizione del cavallo?**

- a. Il fieno
- b. Il mangime
- c. L'acqua

**10. Durante la pulizia del box il cavallo, per motivi di sicurezza, deve rimanere all'interno libero di muoversi o è meglio spostarlo?**

- a. Se possibile è meglio spostarlo
- b. È meglio lasciarlo nel box, ma legato ai 2 venti
- c. È meglio lasciarlo libero nel box

**11. Come si conduce il cavallo alla longhina?**

- a. Stando a destra
- b. Stando a sinistra
- c. Non ha importanza il lato

**12. Il garretto del cavallo è situato nell'arto**

- a. Anteriore
- b. Posteriore

- c. In entrambi

**13. Qual è il modo migliore per avvicinarsi a un cavallo?**

- a. Avvicinandosi da sinistra e usando la voce per avvertimento
- b. Avvicinandosi da destra e usando la voce per avvertimento
- c. Avvicinandosi frontalmente e usando la voce per avvertimento

**14. dove può essere applicato il torcinaso?**

- a. Sul naso
- b. Su naso e orecchio
- c. Sull'orecchio

**15. il cavallo calcia**

- a. Di lato
- b. All'indietro
- c. In avanti

**16. Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) si intende**

- a. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, a sua discrezione, allo scopo di proteggerlo da rischi che potrebbero minacciare la sua sicurezza durante il lavoro
- b. attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute o sicurezza durante il lavoro
- c. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per il contenimento degli animali, per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute

**17. Indicare cosa non è un DPI**

- a. Guanti monouso in lattice/nitrile
- b. Agocannula
- c. Cuffia monouso



**18. Pratiche ambulatoriali, chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, andrologiche e tutte le pratiche diagnostiche in generale, possono comportare un rischio chimico e/o cancerogeno. Le possibili vie di contaminazione sono da ricondursi principalmente a**

- a. Via inalatoria (polveri, aerosol, vapori); contatto con la cute/mucose
- b. Via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati); via inalatoria (polveri, aerosol, vapori)
- c. Via inalatoria (polveri, aerosol, vapori); contatto con la cute/mucose (congiuntiva oculare, mucosa orofaringea); via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati)

**19. Scegliere la definizione corretta relativa all'igiene delle mani**

- a. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa ed alla fine della giornata
- b. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa, tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio, dopo la manipolazione di animali e/o materiali biologici ed alla fine del ciclo di lavoro
- c. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio

**20. Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro**

- a. Il D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009
- b. Il D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2009
- c. I D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011

**21. In un allevamento bovino, a che intervallo devono essere poste le vie di fuga per l'operatore (passi d'uomo) sui lati lunghi delle barriere o rastrelliere che delimitano le aree di stabulazione**

- a. 20-25 metri
- b. 45-50 metri
- c. 65-70 metri

**22. Ogni quanto tempo deve essere effettuato l'aggiornamento del corso per trattoristi**

- a. 4 anni

- b. 3 anni
- c. 5 anni

**23. Durante le operazioni di spostamento delle rotoballe in che posizione va tenuto il caricatore frontale**

- a. in posizione bassa al fine di non innalzare la posizione del baricentro, l'effetto della pendenza trasversale o della forza centrifuga potrebbe determinare il ribaltamento della trattrice
- b. in posizione alta per migliorare la visibilità dell'operatore
- c. dipende dal peso della rotoballa

**24. Secondo il D.Lgs n.146/01, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, quale di questa definizione è corretta**

- a. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali
- b. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle sei settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
- c. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato oltre i dieci giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

**25. Secondo il D.Lgs 126/2011, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, ogni vitello in allevamento deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente a partire dalla**

- a. Dalla quarta settimana di vita
- b. Dalla seconda settimana di vita
- c. Dalla nascita



**26. Una vacca da latte in produzione quanti kg di fieno assume in un giorno**

- a. fino a 10 kg
- b. dai 10 ai 15 kg
- c. dai 15 ai 20 kg

**27. Che tipo di foraggio è più indicato nell'alimentazione del cavallo**

- a. Fieno di erba medica
- b. Fieno polifita
- c. Paglia

**28. Quanta acqua beve una vacca con produzione di 34 kg latte/giorno**

- a. 50 l
- b. 100 l
- c. 150 l

**29. Quale di queste definizioni è corretta per definire un mangime complementare destinato all'alimentazione animale**

- a. Mangime che soddisfa le esigenze nutrizionali giornaliere dell'animale
- b. Mangime addizionato di farmaci per la terapia degli animali
- c. Mangime che per la sua composizione soddisfa la razione giornaliera dell'animale solo se associato ad altri alimenti

**30. Come viene definito quel vizio che può manifestarsi nel cavallo quando l'animale appoggia i denti incisivi su un oggetto, tirando indietro la testa, inarcando il collo e nel contempo ingerendo aria, saliva ed emettendo un rumore simile a un grunito?**

- a. Tic di appoggio
- b. Vizio di posizione
- c. Vizio di spinta